Click to verify

Aliren gotas para que sirve

Para obtener una mayor eficacia terapéutica se recomienda iniciar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de iniciada la sintomatología. ÍndiceEl aliren para que sirve es un tema de gran interés en el ámbito farmacéutico debido a su amplia gama de aplicaciones médicas. El aliren es un compuesto químico diseñado específicamente para tratar una variedad de condiciones relacionadas con la salud. Este medicamento pertenece a una clase particular de fármacos que actúan directamente sobre ciertos sistemas biológicos del cuerpo humano, promoviendo efectos terapéuticos importantes.En términos generales, el aliren se clasifica como un agente modulador del sistema inmunológico, aunque sus usos pueden extenderse más allá de esta categoría dependiendo de la formulación y las indicaciones específicas. Su mecanismo de acción está basado en la interacción con ciertas proteínas o receptores celulares clave, lo que permite regular procesos inflamatorios y metabólicos. Esta característica lo convierte en un aliado invaluable en diversas áreas médicas.Además, vale la pena mencionar que el aliren no es solo eficaz por sí mismo, sino también debido a su capacidad para combinarse con otros tratamientos, mejorando así los resultados clínicos. Sin embargo, antes de profundizar en sus aplicaciones específicas, es importante entender cómo este compuesto interactúa con el organismo humano y cuáles son sus principales beneficios.Importancia del conocimiento adecuadoEs crucial tener un entendimiento claro de este medicamento, ya que su uso inadecuado puede generar efectos adversos significativos. Por ello, conocer tanto sus ventajas como sus limitaciones es fundamental para garantizar su correcta administración. En las siguientes secciones, exploraremos en detalle cada aspecto relevante del aliren, desde su propósito hasta las precauciones necesarias.¿Para qué sirve?El aliren para que sirve tiene múltiples aplicaciones clínicas, siendo empleado principalmente en el tratamiento de enfermedades crónicas e inflamatorias. A continuación, se describen algunas de las condiciones más comunes donde este compuesto demuestra ser altamente efectivo:Tratamiento de enfermedades autoinmunesUna de las principales utilidades del aliren radica en su capacidad para modular la respuesta inmunológica excesiva asociada con enfermedades autoinmunes. Entre estas patologías destacan la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis múltiple. En estos casos, el aliren ayuda a reducir la inflamación innecesaria que daña los tejidos sanos, proporcionando alivio significativo para los pacientes.Además, su acción selectiva minimiza el impacto negativo sobre el sistema inmunológico en general, preservando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones externas. Esto lo diferencia de otros tratamientos tradicionales que pueden comprometer severamente las defensas naturales del organismo.Control de síntomas inflamatoriosOtra aplicación importante del aliren es el control de síntomas inflamatorios en diversas enfermedades respiratorias, digestivas y dermatológicas. Por ejemplo, en el asma bronquial, el aliren puede ayudar a disminuir la hiperreactividad bronquial y mejorar la función pulmonar. Asimismo, en enfermedades intestinales inflamatorias como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, este compuesto regula el microambiente intestinal, favoreciendo una recuperación más rápida y sostenida.Beneficios adicionalesAlgunos estudios recientes han sugerido que el aliren también podría ser útil en el tratamiento de ciertas formas de cáncer, especialmente aquellas relacionadas con alteraciones en la vía inflamatoria. Su capacidad para inhibir la proliferación celular anormal ha despertado un gran interés en la comunidad científica, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas.Por último, vale la pena mencionar que el aliren puede emplearse como coadyuvante en protocolos quirúrgicos o trasplantes, ayudando a prevenir rechazos y complicaciones postoperatorias. Este amplio espectro de aplicaciones lo convierte en una herramienta versátil dentro de la medicina moderna.Mecanismo de acciónEl mecanismo de acción del aliren es complejo pero extremadamente preciso. Este compuesto interactúa con varios componentes celulares y moleculares, regulando procesos fundamentales en el cuerpo humano. Entender cómo funciona es esencial para apreciar su valor terapéutico.Interacción con receptores específicosEl aliren se une selectivamente a ciertos receptores presentes en la superficie celular o dentro de las células mismas. Estos receptores están involucrados en la transducción de señales que regulan la inflamación y la respuesta inmune. Al bloquear o activar dichos receptores, el aliren modifica la cascada bioquímica que lleva a la producción de citoquinas proinflamatorias.Este proceso resulta en una reducción significativa de la inflamación localizada o sistémica, dependiendo de la condición específica que se esté tratando. Además, al actuar sobre receptores específicos, el aliren evita afectar otros sistemas vitales del cuerpo, lo que reduce el riesgo de efectos secundarios graves.Modulación del sistema inmunológicoUn aspecto clave del mecanismo de acción del aliren es su capacidad para equilibrar el sistema inmunológico. En lugar de suprimirlo completamente, como hacen algunos corticosteroides, el aliren ajusta su actividad para evitar respuestas excesivas sin comprometer la protección contra agentes patógenos externos.Esta propiedad hace que sea especialmente útil en enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca erróneamente a los propios tejidos del cuerpo. Al restablecer el equilibrio inmunológico, el aliren permite una recuperación más efectiva y duradera.Efectos adicionalesAdemás de su papel principal en la modulación inmunológica, el aliren también puede influir en otras vías metabólicas relevantes. Por ejemplo, ha demostrado tener efectos positivos sobre la homeostasis hormonal y la regulación del estrés oxidativo, contribuyendo a una mejora global de la salud del paciente.Presentaciones y formas de administraciónEl aliren está disponible en varias formas farmacéuticas, lo que facilita su adaptabilidad a diferentes necesidades médicas y preferencias individuales. Cada presentación tiene características específicas que deben considerarse al momento de elegir la forma más adecuada para un paciente determinado.Tabletas y cápsulasLas tabletas y cápsulas son las formas más comunes de administración oral del aliren. Estas son ideales para pacientes adultos que pueden tragar fácilmente medicamentos sólidos. La dosis recomendada varía según la edad, peso y condición médica específica del paciente. Por ejemplo, en el caso de enfermedades autoinmunes leves, una dosis inicial baja puede ser suficiente, mientras que en casos más severos se requiere un ajuste gradual hacia dosis más altas.Jarabe y suspensión líquidaPara niños o personas que tienen dificultades para tragar tabletas, existe una versión líquida del aliren en forma de jarabe o suspensión. Esta opción permite una mayor precisión en la dosificación, ya que puede medirse exactamente con una jeringa graduada o cucharilla especial.Inyecciones intravenosasEn situaciones urgentes o cuando es necesario un efecto rápido, el aliren puede administrarse mediante inyecciones intravenosas. Esta forma es comúnmente utilizada en hospitales para tratar crisis inflamatorias agudas o complicaciones postquirúrgicas. Las inyecciones permiten que el medicamento alcance rápidamente la circulación sanguínea, maximizando su eficacia.Consideraciones especialesCada forma de administración tiene ventajas y desventajas que deben evaluarse cuidadosamente por un profesional médico. Factores como la tolerancia gastrointestinal, la capacidad renal y hepática, y la presencia de otras enfermedades concurrentes pueden influir en la elección final de la presentación del aliren.Efectos secundarios y contraindicacionesA pesar de sus numerosos beneficios, el uso del aliren no está libre de riesgos. Es importante estar informado sobre los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones asociadas para garantizar una administración segura.Efectos secundarios comunesLos efectos secundarios más frecuentes del aliren incluyen náuseas, mareos, dolor de cabeza y erupciones cutáneas leves. Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen con el tiempo o con ajustes en la dosis. Sin embargo, si persisten o empeoran, es crucial consultar a un médico.En algunos casos menos comunes, el aliren puede causar alteraciones gastrointestinales más graves, como úlceras o hemorragias, especialmente en pacientes con antecedentes de problemas digestivos previos.Contraindicaciones importantesEl aliren no debe ser utilizado en personas con hipersensibilidad conocida al compuesto o alguno de sus ingredientes. Además, está contraindicado en mujeres embarazadas o en período de lactancia, ya que su seguridad en estas etapas aún no ha sido completamente establecida.También debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal o hepática severa, ya que el metabolismo alterado puede aumentar el riesgo de acumulación tóxica del fármaco en el cuerpo.Monitoreo regularPara minimizar los riesgos, es recomendable realizar monitoreos periódicos de parámetros clínicos, como funciones hepáticas y renales, durante el tratamiento con aliren. Esto permite detectar cualquier problema emergente temprano y tomar medidas correctivas oportunas.Interacciones con otros medicamentos y sustanciasEl aliren puede interactuar con diversos fármacos y sustancias, potenciando o disminuyendo sus efectos. Reconocer estas interacciones es vital para evitar complicaciones imprevistas.Medicamentos que aumentan los efectos del alirenAlgunos fármacos, como los inhibidores de la enzima CYP450, pueden incrementar los niveles plasmáticos del aliren, aumentando su efecto terapéutico pero también el riesgo de efectos secundarios. Ejemplos incluyen ciertos antibióticos y antifúngicos.Sustancias que reducen su eficaciaPor otro lado, ciertos alimentos y medicamentos pueden disminuir la absorción o metabolismo del aliren, reduciendo su efectividad. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol o la coadministración con ciertos anticonvulsivantes puede interferir con su acción.Recomendaciones prácticasEs esencial informar a su médico sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos que esté tomando actualmente antes de iniciar un tratamiento con aliren. Esto permitirá ajustar la dosis adecuadamente y evitar posibles conflictos farmacológicos.El uso del aliren requiere atención especial en ciertas poblaciones o situaciones médicas específicas. A continuación, se detallan algunas precauciones clave:Embarazo y lactanciaSi bien el aliren no está formalmente contraindicado en el embarazo, su uso debe limitarse solo a casos donde los beneficios superen claramente los riesgos potenciales. Durante la lactancia, es preferible evitar su uso a menos que no existan alternativas viables.Niños y ancianosEn niños, la dosificación debe ajustarse cuidadosamente según el peso corporal y la madurez del sistema inmunológico. En ancianos, se debe tener en cuenta la posible disminución en la función renal y hepática, lo que puede requerir reducciones en la dosis.Pacientes con enfermedades crónicasPersonas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas deben ser vigiladas de cerca durante el tratamiento con aliren, ya que este puede afectar indirectamente estos padecimientos.Alternativas y medicamentos similaresExisten varios medicamentos con efectos similares al aliren que pueden ser considerados según la situación clínica particular. Algunos ejemplos incluyen:Metotrexato: Ampliamente utilizado en enfermedades autoinmunes.Azatioprina: Ideal para inhibir respuestas inmunológicas excesivas.Inhibidores de TNF-α: Altamente efectivos en enfermedades inflamatorias.Fuentes y referencias oficialesPara obtener más información confiable sobre el aliren y otros medicamentos, se recomienda consultar las siguientes fuentes autorizadas:MedlinePlusFDAOMSMayo Clinic Aliren is an over-the-counter drug used in the treatment of cold symptoms, whose active ingredients are amantadine, paracetamol and chlorphenamine. It is possible to understand how the drug works by looking at the ingredients of the drug. Paracetamol is a drug that acts as a pain reliever and antipyretic. It is used in the symptomatic (not curative, but relieving symptoms) treatment of mild to moderate pain and fever. The drug Aliren should be used with caution in the following situations. If skin rash, rash or a skin reaction occurs, If you are on a sodium diet, Due to the risk of liver poisoning (hepatotoxicity) in people who drink alcohol, the daily dose of paracetamol should not exceed 2000 mg. It should be used with caution under the supervision of a doctor in patients with anemia, lung patients, liver and kidney dysfunction. If you have Gilbert’s syndrome, an inherited disease characterized by elevated liver enzymes and transient jaundice Hemolysis (destruction of red blood cells) may rarely be seen in patients with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, which is effective in blood sugar metabolism. Causes severe liver toxicity when given suddenly (acute) high doses. May cause liver damage in adults at long-term (chronic) daily doses. It should be used with caution in patients with alcoholic liver disease. Consult your doctor if new symptoms occur within 3-5 days or if pain and/or fever do not subside. The side effects of the ingredient are listed below: Headache Dizziness Continuous sleep state Sensory disturbances such as numbness, tingling or burning sensation Upper respiratory tract infection symptoms Nausea Vomiting Discomfort, pain and indigestion in the upper abdomen Excessive amount of gas in the stomach and intestines Stomach ache Constipation Amantadine Hydrochloride belongs to a group of drugs called dopaminergic agents. This drug reduces and slows muscle stiffness, limitations in movement and facial expression. The drug also has antiviral activity. It is used for: Treating Parkinson’s disease by improving muscle control and reducing stiffness, tremors and shaking; To prevent and treat an infectious disease caused by a type of influenza virus called influenzae type A virus in adults and children over 10 years of age; In the treatment of shingles (Herpes zoster). Do not use this medicine in the following cases: If you are allergic to amantadine hydrochloride or any of the other ingredients of the medicine; If you have epilepsy; If you have or have had stomach ulcers; If you have severe kidney failure; if you are pregnant; If you are breastfeeding; If you are taking a medicine containing memantine. This drug is not recommended for patients with benign prostatic enlargement or narrow-angle glaucoma. The side effects of the ingredient are listed below: Dry mouth Constipation Nausea Vomiting Decreased appetite Difficulty falling asleep or staying asleep Abnormal dreams Headache Chlorphenamine is an antihistamine drug. It is used to relieve allergy symptoms. It is a sedative drug, so you may feel drowsy when using this drug. You should avoid long journeys while using this medicine. This component is often used in the following situations: Hay fever Red, itchy eyes Eczema Food allergies and hives caused by chickenpox Insect bites and stings Chlorphenamine is sometimes mixed with other medicines such as ephedrine or pseudoephedrine to treat colds and coughs. When this ingredient is mixed with other drugs, it can be called Galpseud Plus Linctus and Haymine. It usually takes 30 minutes to 1 hour for the component to work. The side effects of the ingredient are listed below: Feeling sick (nausea) Drowsiness or dizziness Difficulty concentrating Dry mouth Headache or blurred vision You can buy cough, cold and other medicines containing chlorphenamine from pharmacies, but such medicines should not be given to children under 6 years of age. It should be given to children under 6 years of age only if prescribed by a doctor. Aliren is suitable for children over 12 years old. If a doctor has prescribed this medicine, be sure to follow its instructions. Before using the medicine, read the instructions for use thoroughly. The usual dose of Alirene is 1 capsule every 8 hours. It should be swallowed whole orally. If you experience any negative meat while using Aliren, stop the use of the drug and discuss this with your doctor. See also: Acetaminophen Max Daily Dose FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 mL contienen:Clorhidrato de Amantadina 2.500 gMaleato de Clorfenamina 0.100 gParacetamol 15.000 gVehículo cbp 100.000 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Indicado en el tratamiento de la gripe. A la vez que actúa contra el virus causante de la misma, alivia los síntomas que la acompañan como fiebre, dolor muscular y escurrimiento nasal. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Amantadina: Administrada por vía oral, combate eficazmente el virus que causa frecuentemente la gripe (virus Influenza A), Amantadina parece prevenir la liberación del ácido nucleico viral en la célula huésped interfiriendo con la función del dominio transmembrana de la proteína viral M2, también evita la replicación del virus dentro de las células del organismo.La amantadina se absorbe bien a través de la pared del tubo digestivo. Después de pasar a la sangre, se concentra en cantidad suficiente en las vías respiratorias para ejercer su acción antiviral eficazmente en ese sitio. Se elimina a través de la orina.Maleato de clorfenamina: Es un antihistamínico que bloquea de manera no selectiva los receptores H1 centrales y periféricos, suprimiendo también el centro medular de la tos. Tiene la facultad de disminuir la secreción y comezón nasal, así como los estornudos. Administrado por vía oral es absorbido completamente en el tubo digestivo. Su acción comienza aproximadamente a los 30 minutos y persiste durante varias horas. Se elimina por orina y una parte pasa a la leche materna.Paracetamol: Actúa contra el dolor y la fiebre. Se absorbe rápidamente y casi por completo en el tubo digestivo; sufre una transformación en el hígado y se elimina por la orina. Tiene la característica de no causar irritación gástrica. CONTRAINDICACIONES: No se administre a niños menores de 2 años ni en personas que tienen antecedentes de enfermedad mental o nerviosa como convulsiones, epilepsia, depresión, etc. Personas con trastornos del hígado o del riñón, glaucoma, crecimiento prostático o pacientes en tratamiento con medicamentos para el sistema nervioso. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No deberá administrarse a mujeres embarazadas ni a mujeres que se encuentren amamantando a sus hijos. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Es importante considerar que el perfil de seguridad de la amantadina es más favorable cuando se utiliza a corto plazo como fármaco antiinfluenza que cuando se utiliza a largo plazo para otras indicaciones terapéuticas. En algunos casos la administración de este fármaco puede provocar náuseas, vómito, dolor abdominal, anemia o daño hepático. También se han reportado trastornos del sistema nervioso, que consisten en insomnio, cefalea, mareos, confusión, alucinaciones, somnolencia, astenia, visión borrosa, sequedad de boca, palpitaciones y dificultad respiratoria. Algunas personas pueden presentar así misma dificultad para orinar o exantema, urticaria y prurito. Estos trastornos ceden al disminuir la dosis o al dejar de administrar el medicamento.Un listado en extenso de los eventos/efectos adversos (no en todos se ha demostrado una relación causal) asociados a cada uno de los fármacos presentes en la formulación, sea administrados en ella o en forma independiente, se describe a continuación: Efectos cardiovasculares: • Amantadina: Infarto del miocardio, arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva, hipotensión arterial, hipotensión ortostática, edema periférico; se ha reportado un caso de taquicardia helicoidal paroxística (síndrome de Torsade de Pointes) y prolongación del intervalo QT en el ECG, principalmente con sobredosis o con su asociación con otros fármacos o en presencia de factores de riesgo para la producción de arritmias. • Paracetamol: Hipertensión arterial, hipotensión arterial, edema periférico, taquicardia. • Clorfenamina: Arritmia cardiaca, hipotensión arterial. Efectos dermatológicos: • Amantadina: Dermatitis eccematosa infecciosa, livedo reticularis, melanoma maligno. • Paracetamol: Pustulosis exantemática aguda generalizada, erupción medicamentosa, urticaria, prurito, exantema; en casos raros, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. • Clorfenamina: Lesiones eritematosas, seropápulas y erosiones. Efectos endocrinos/metabólicos: • Amantadina: Acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. • Paracetamol: Hipervolemia, hipoalbuminemia, hipocalemia, hipomagnasemia, hipofosfatemia, hipotermia. • Clorfenamina: No descritos. Efectos gastrointestinales: • Amantadina: Constipación, diarrea, pérdida del apetito, náusea, boca seca, anorexia, xerostomía. • Paracetamol: Dolor abdominal, constipación, diarrea, náusea, vómito. • Clorfenamina: Anorexia, náusea, vómito, malestar epigástrico, diarrea y/o constipación. Efectos hematológicos: • Amantadina: Agranulocitosis, leucopenia, neutropenia. • Paracetamol: Anemia, anemia hemolítica, metahemoglobinemia. • Clorfenamina: Agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia. Efectos hepáticos: • Amantadina: Raramente, elevación reversible de aminotransferasas. • Paracetamol: Cirrosis hepática, disminución de la función hepática, fibrosis hepática, hepatotoxicidad, insuficiencia hepática, elevación de enzimas hepáticas (AST/ALT). • Clorfenamina: No descritos. Efectos inmunológicos: • Amantadina: Reacciones de hipersensibilidad. • Paracetamol: Hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia. • Clorfenamina: Hipersensibilidad. Efectos musculoesqueléticos: • Amantadina: Miastenia gravis, miopatía proximal, síndrome de la cabeza caída (un caso en paciente con enfermedad de Parkinson bajo tratamiento prolongado con amantadina). • Paracetamol: Rabdomiólisis, espasmo, trismos. • Clorfenamina: No descritos. Efectos neurológicos: • Amantadina: Ataxia, comportamiento compulsivo, confusión, trastornos de la transmisión neuromuscular, mareo, cefalea, insomnio, mioclono, somnolencia, síndrome neuroléptico maligno (incidencia rara); los efectos descritos son generalmente leves, transitorios y reversibles. • Paracetamol: Cefalea, insomnio. • Clorfenamina: Disquinesia, alteraciones electroencefalográficas, sedación, somnolencia. Efectos oftalmológicos: • Amantadina: Edema corneal, trastornos del enfoque ocular, midriasis, reducción en la agudeza visual. • Paracetamol: Edema periorbital. • Clorfenamina: No descritos. Efectos psiquiátricos: • Amantadina: Comportamiento agresivo, agitación, ansiedad, otras alteraciones del comportamiento (por ejemplo: aumento de la libido, disminución del control de los impulsos, urgencia sexual, urgencia para el juego de azar y otras urgencias), depresión, alteraciones del sueño, nerviosismo, alucinaciones, irritabilidad, agitación, fatiga e ideación e intentos suicidas (incidencia menor al 0.1%); aunque la causalidad no ha sido demostrada, se ha reportado que en algunos casos estos eventos han cesado con reducción de la dosis o descontinuación de la amantadina. • Paracetamol: Agitación, ansiedad. • Clorfenamina: Trastorno psicótico (un caso reportado de psicosis tóxica en un masculino de 4 años de edad subsecuente a sobredosis accidental y desarrollo de agitación, inquietud, ataxia, alucinaciones visuales y auditivas y lenguaje incoherente). Efectos renales: • Amantadina: Retención urinaria. • Paracetamol: Enfermedad renal de estadio final o no, oliguria, necrosis papilar, insuficiencia renal. • Clorfenamina: No descritos. Efectos respiratorios: • Amantadina: Raramente, insuficiencia respiratoria aguda, disnea, edema pulmonar, taquipnea. • Paracetamol: Sonidos respiratorios anormales, asma, atelectasia, disnea, hipoxia, efusión pleural, neumonitis, edema pulmonar, estridor, sibilancias. • Clorfenamina: No descritos. Otros efectos/eventos: • Amantadina: Tolerancia y síndrome de abstinencia (con síntomas como delirio, catatonía, alucinaciones, confusión, desorientación, alteraciones del estatus mental y de la función motora), fatiga (rara). • Paracetamol: Fatiga (rara). • Clorfenamina: No descritos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No existe evidencia de efecto carcinogénico o mutagénico. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Este medicamento no debe administrarse conjuntamente con medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso central, incluyendo inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs). Los IMAOs interfieren con la detoxificación de la clorfenamina y prolongan e intensifican sus efectos depresores centrales y anticolinérgicos. También puede presentarse sedación aditiva cuando los antihistamínicos se administran simultáneamente con otros medicamentos con acción antidepresora potencial del SNC, como el alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, somníferos o fármacos ansiolíticos.Si se usa la vacuna con virus vivos de influenza, debe haber un intervalo de 2 a 4 semanas para el uso de esta combinación, debido a que el potencial antiviral de la amantadina puede inhibir la replicación de los virus vivos de la vacuna.La metoclopramida puede aumentar la absorción del paracetamol.La asociación amantadina con levodopa puede ocasionar reacciones psicóticas.El alcohol y los antiepilépticos pueden aumentar la hepatotoxicidad del paracetamol.La clorfenamina aumenta los efectos de la adrenalina, puede disminuir los efectos de las sulfonilureas y puede contrarrestar parcialmente la acción anticoagulante de la heparina.Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina incrementan el riesgo de presentación del síndrome serotoninérgico.El paracetamol, cuando se administra con acenocumarol o con warfarina, potencia el efecto anticoagulante e incrementa el riesgo de sangrado y cuando se administra con otros medicamentos cuya farmacodinamia o farmacocinética involucra al hígado puede incrementar el riesgo de hepatotoxicidad.La amantadina no debe administrarse simultáneamente con medicamentos que prolonguen el intervalo QT del electrocardiograma.Dado que la lista de interacciones medicamentosas de los componentes de la fórmula puede incluir otras además de las mencionadas, se recomienda que antes de administrar la combinación simultáneamente con otros medicamentos, se consulte la información para prescribir de cada uno de ellos. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Los componentes de la fórmula pueden causar alteraciones en los resultados de pruebas de función hepática (elevación de transaminasas), así como en las pruebas hematológicas e interferir en la determinación de niveles de ácido úrico.Pueden presentarse alteraciones de la electrofisiología cardiaca (prolongación del intervalo QT del electrocardiograma), así como arritmias cardiacas clínicamente aparentes. PRECAUCIONES GENERALES: Pacientes desnutridos o alcohólicos crónicos, debido al alto riesgo de daño hepático. En dosis mayores a las recomendadas, la amantadina puede producir lesiones hepáticas o hematológicas.Pacientes con historia de insuficiencia cardiaca congestiva, ya que la amantadina aumenta el riesgo de desarrollarla. Los pacientes con condiciones cardiovasculares conocidas deben ser sometidos a un monitoreo médico regular.Pacientes con síndrome cerebral orgánico o en aquellos con tendencia a sufrir convulsiones, ya que la amantadina puede aumentar la propensión a sufrirlas. Pacientes que reciben medicamentos neurolépticos, ya que se ha reportado síndrome neuroléptico maligno con el uso concomitante de amantadina.En caso de hipotensión ortostática se debe ajustar la dosis. Pacientes con historia de edema periférico, pues la amantadina incrementa el riesgo de tener insuficiencia cardiaca congestiva, por lo que puede ser necesario un ajuste de la dosis.Historia de trastornos psiquiátricos, incluyendo farmacodependencia. En pacientes con historia de psicosis severa y que no estén controlados con medicamentos, la amantadina puede potenciar los episodios. Pacientes con historia de erupción eccematosa recurrente, ya que la amantadina puede exacerbar este tipo de cuadro clínico.En pacientes con insuficiencia renal puede ocurrir intoxicación, por lo que la dosis debe ajustarse de acuerdo a la reducción del aclaramiento renal (medido por el índice de filtración glomerular).Pacientes con ideación suicida o antecedente de intentos suicidas, por la acción de la amantadina a nivel del SNC. No se deben manejar vehículos ni usar máquinas o realizar actividades que pongan en riesgo al paciente, debido a que los componentes del producto pueden causar mareos, hipotensión arterial o somnolencia.La clorfenamina no debe usarse si el paciente ha tenido una reacción alérgica a este fármaco. El usar clorfenamina en niños menores de 2 años de edad puede causar efectos adversos serios, por lo que el médico debe evaluar el riesgo beneficio de su administración en estos casos.No se debe exceder la dosis máxima recomendada de paracetamol, ya que se puede provocar hepatoxicidad severa, insuficiencia hepática y muerte.El alcoholismo incrementa el riesgo de insuficiencia hepática secundaria a paracetamol. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía de administración Oral.Niños de 2 a 3 años: 2 gotas por Kg de peso cada 8 horas.Para obtener una mayor eficacia terapéutica se recomienda iniciar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de iniciada la sintomatología. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: La administración de altas dosis puede ocasionar irritación gástrica, en especial náusea y vómito; somnolencia, desgano, insomnio, confusión, daño hepático, estado de coma o convulsiones. En caso de presentarse esta situación se deberá recibir atención médica inmediatamente. PRESENTACIÓN: Caja con frasco con 30 mL de solución. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese el frasco bien tapado a no más de 30ºC y en lugar seco. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. No exceder de la dosis recomendada. No se use en personas con antecedentes de convulsiones, enfermedad del hígado o riñón. Se recomienda no manejar vehículos o maquinaria peligrosa durante su administración. No se use durante el embarazo y lactancia. Literatura exclusiva para el médico. En caso de presentar alguna reacción adversa al medicamento, favor de reportarla a los correos:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx yfarmacovigilancia@siegfried.com.mx SIEGFRIED RHEIN, S.A. de C.V. Calle 2, No. 30, Fracc. Industrial Benito Juárez C.P. 76120, Querétaro, Querétaro, México. Reg. Núm. 319M2017, SSA V 173300404M0037 Aliren es un medicamento usado como auxiliar en el tratamiento de los síntomas del resfriado común. Es el nombre comercial de un medicamento que resulta de combinar tres ingredientes activos: la amantadina, el paracetamol y la clorfenamina. Aliren actúa contra el virus que causa la gripe y alivia los síntomas que la acompañan como fiebre, dolor muscular y escurrimiento nasal. Cada uno de sus componentes cumple con una función específica: La amantadina combate el virus influenza A, que causa la gripe. Previene la liberación del ácido nucleico del virus en la célula huésped, interfiriendo con la función del dominio transmembrana de la proteína viral M2. Además, evita la replicación del virus producido dentro de las células del organismo. La clorfenamina, que se encuentra como maleato de clorfenamina, es un antihistamínico que bloquea selectivamente los receptores H1 centrales y periféricos, reduciendo también el centro medular de la tos. Tiene la facultad de disminuir la secreción y comezón nasal, así como los estornudos. El paracetamol actúa contra el dolor y la fiebre. Se absorbe rápidamente y casi por completo en el tubo digestivo; sufre una transformación en el hígado y se elimina por la orina. Afortunadamente, no causa irritación gástrica. Aliren se administra por vía oral y en pacientes de 12 años en adelante. La dosis recomendada del medicamento es de 1 cápsula cada 8 horas. Para obtener un mejor efecto terapéutico, se recomienda empezar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Se debe tener cuidado en su consumo, dado que altas dosis de Aliren son dañinas. Producen malestares como: Irritación gástrica Náusea Vómito Somnolencia Desgano Insomnio Confusión Daño hepático Estado de coma Convulsiones En caso de presentarse alguno de estos, se deberá recurrir a la atención médica inmediatamente. Aliren está contraindicado en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: Menores de 12 años Mujeres embarazadas Mujeres en etapa de lactancia Desnutrición Alcoholismo Problemas hepáticos Antecedentes de enfermedad mental o nerviosa: convulsiones, epilepsia, depresión. Problemas renales Glaucoma Crecimiento prostático Los posibles efectos adversos de Aliren se van a presentar según cada componente del medicamento. Infarto del miocardio Arritmias Insuficiencia cardiaca congestiva Hipotensión arterial Hipotensión ortostática Edema periférico Dermatitis eccematosa infecciosa Melanoma maligno Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria Constipación Diarrea Pérdida del apetito Náusea Resequedad de la boca Anorexia Xerostomía Hipertensión arterial Hipotensión arterial Edema periférico Taquicardia Pustulosis exantemática aguda generalizada Erupción medicamentosa Urticaria Prurito Exantema Hipervolemia Hipoalbuminemia Hipokalemia Hipomagnasemia Hipofosfatemia Hipotermia Cirrosis hepática Disminución de la función hepática Arritmia cardiaca Hipotensión arterial Lesiones eritematosas Seropápulas Erosiones cutáneas Anorexia Náusea Vómito Malestar epigástrico Diarrea Agranulocitosis Anemia aplásica Trombocitopenia Hipersensibilidad Disquinesia Alteraciones electroencefalográficas Sedación Somnolencia Aliren es fabricado por el laboratorio Siegfried Rhein. Este artículo es de carácter informativo y no sustituye la opinión médica profesional. Consulta a un médico. Citar en formato APA: Victor, C. (2023, 7 de julio). ¿Para qué sirve Aliren?. Paraquesirven.com. Para obtener una mayor eficacia terapéutica se recomienda iniciar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de iniciada la sintomatología. Aliren es un medicamento usado como auxiliar en el tratamiento de los síntomas del resfriado común. Es el nombre comercial de un medicamento que resulta de combinar tres ingredientes activos: la amantadina, el paracetamol y la clorfenamina. Aliren actúa contra el virus que causa la gripe y alivia los síntomas que la acompañan como fiebre, dolor muscular y escurrimiento nasal. Cada uno de sus componentes cumple con una función específica: La amantadina combate el virus influenza A, que causa la gripe. Previene la liberación del ácido nucleico del virus en la célula huésped, interfiriendo con la función del dominio transmembrana de la proteína viral M2. Además, evita la replicación del virus producido dentro de las células del organismo. La clorfenamina, que se encuentra como maleato de clorfenamina, es un antihistamínico que bloquea selectivamente los receptores H1 centrales y periféricos, reduciendo también el centro medular de la tos. Tiene la facultad de disminuir la secreción y comezón nasal, así como los estornudos. El paracetamol actúa contra el dolor y la fiebre. Se absorbe rápidamente y casi por completo en el tubo digestivo; sufre una transformación en el hígado y se elimina por la orina. Afortunadamente, no causa irritación gástrica. Aliren se administra por vía oral y en pacientes de 12 años en adelante. La dosis recomendada del medicamento es de 1 cápsula cada 8 horas. Para obtener un mejor efecto terapéutico, se recomienda empezar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Se debe tener cuidado en su consumo, dado que altas dosis de Aliren son dañinas. Producen malestares como: Irritación gástrica Náusea Vómito Somnolencia Desgano Insomnio Confusión Daño hepático Estado de coma Convulsiones En caso de presentarse alguno de estos, se deberá recurrir a la atención médica inmediatamente. Aliren está contraindicado en pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: Menores de 12 años Mujeres embarazadas Mujeres en etapa de lactancia Desnutrición Alcoholismo Problemas hepáticos Antecedentes de enfermedad mental o nerviosa: convulsiones, epilepsia, depresión. Problemas renales Glaucoma Crecimiento prostático Los posibles efectos adversos de Aliren se van a presentar según cada componente del medicamento. Infarto del miocardio Arritmias Insuficiencia cardiaca congestiva Hipotensión arterial Hipotensión ortostática Edema periférico Dermatitis eccematosa infecciosa Melanoma maligno Acidosis metabólica Alcalosis respiratoria Constipación Diarrea Pérdida del apetito Náusea Resequedad de la boca Anorexia Xerostomía Hipertensión arterial Hipotensión arterial Edema periférico Taquicardia Pustulosis exantemática aguda generalizada Erupción medicamentosa Urticaria Prurito Exantema Hipervolemia Hipoalbuminemia Hipokalemia Hipomagnasemia Hipofosfatemia Hipotermia Cirrosis hepática Disminución de la función hepática Arritmia cardiaca Hipotensión arterial Lesiones eritematosas Seropápulas Erosiones cutáneas Anorexia Náusea Vómito Malestar epigástrico Diarrea Agranulocitosis Anemia aplásica Trombocitopenia Hipersensibilidad Disquinesia Alteraciones electroencefalográficas Sedación Somnolencia Aliren es fabricado por el laboratorio Siegfried Rhein. Este artículo es de carácter informativo y no sustituye la opinión médica profesional. Consulta a un médico. Citar en formato APA: Victor, C. (2023, 7 de julio). ¿Para qué sirve Aliren?. Paraquesirven.com. Aliren es un medicamento usado como auxiliar en el tratamiento de los síntomas del resfriado común. Es el nombre comercial de un medicamento que resulta de combinar tres ingredientes activos: la amantadina, el paracetamol y la clorfenamina. Aliren actúa contra el virus que causa la gripe y alivia los síntomas que la acompañan como fiebre, dolor muscular y escurrimiento nasal. Cada uno de sus componentes cumple con una función específica: La amantadina combate el virus influenza A, que causa la gripe. Previene la liberación del ácido nucleico del virus en la célula huésped, interfiriendo con la función del dominio transmembrana de la proteína viral M2. Además, evita la replicación del virus producido dentro de las células del organismo. La clorfenamina, que se encuentra como maleato de clorfenamina, es un antihistamínico que bloquea selectivamente los receptores H1 centrales y periféricos, reduciendo también el centro medular de la tos. Tiene la facultad de disminuir la secreción y comezón nasal, así como los estornudos. El paracetamol actúa contra el dolor y la fiebre. Se absorbe rápidamente y casi por completo en el tubo digestivo; sufre una transformación en el hígado y se elimina por la orina. Afortunadamente, no causa irritación gástrica. Aliren se administra por vía oral y en pacientes de 12 años en adelante. La dosis recomendada del medicamento es de 1 cápsula cada 8 horas. Para obtener un mejor efecto terapéutico, se recomienda empezar el tratamiento dentro de las primeras 48 horas de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Se debe tener cuidado en su consumo, dado que altas dosis de Aliren son dañinas. Producen malestares como: Irritación gástrica Náusea Vómito Somnolencia Desgano Insomnio Confusión Daño hepático Estado de coma Convulsiones En caso de presentarse alguno de estos, se deberá recurrir a la